

Síndromes neurológicos más comunes

1
Fármaco de elección para el tratamiento de la jaqueca:
a. metisergide
b. propranolol
c. ciproheptadina
d. ergotamina y sus derivados
e. difenilhidantoinato de sodio

2
Una de las siguientes causas es la responsable del dolor de cabeza común:
a. tumor intracraneano
b. trastorno funcional de los vasos sanguíneos
c. traumatismos craneoencefálicos repetidos
d. insomnio
e. edema cerebral

3
Una de las siguientes aseveraciones es cierta en relación con la cefalea en pacientes del sexo femenino:
a. aumenta la frecuencia alrededor del periodo menstrual
b. es característicamente de localización occipital
c. siempre disminuye con la administración de diuréticos
d. es más frecuente en la vejez
e. siempre se presenta en los periodos de lactancia

4
El gran mal está incluido dentro del grupo de las crisis:
a. visuales
b. auditivas
c. parciales elementales
d. parciales complejas
e. generalizadas

5
La forma Jacksoniana de la epilepsia se clasifica como:
a. crisis parcial elemental
b. crisis generalizada
c. crisis parcial compleja
d. cuadriplejía cerebral espástica
e. coreoatetosis

6
El estudio del paciente con epilepsia debe incluir, cuando menos:
a. ecoencefalograma
b. electroencefalograma
c. arteriografía carotídea
d. neumoencefalograma
e. tomografía axial computarizada

7
Cuando decimos "status epilepticus" nos estamos refiriendo a:
a. las crisis convulsivas con pérdida de la conciencia
b. las crisis convulsivas repetidas cuando menos cada 24 horas
c. las crisis convulsivas repetidas sin recuperación de la conciencia
d. las crisis convulsivas aquinélicas
e. la epilepsia mioclónica

8
Uno de los siguientes es el más común de los trastornos que afectan los ganglios basales:
a. ataxia hereditaria progresiva
b. epilepsia
c. síndrome de Korsakoff
d. enfermedad de Parkinson
e. atrofia muscular progresiva

9
Los siguientes son datos de isquemia cerebral transitoria en el territorio vertebrobasilar, EXCEPTO:
a. vértigo
b. diplopia
c. ataxia uni o bilateral
d. amnesia global transitoria
e. amaurosis fugaz

10
El tratamiento de la hidrocefalia normotensa debe hacerse mediante:
a. trépanos descompresores
b. radiaciones periódicas
c. válvula ventrículo-atrial de baja presión
d. administración intravenosa de diuréticos
e. administración intratecal de esteroides

RESPUESTAS

1. d	6. b
2. b	7. c
3. a	8. d
4. e	9. e
5. a	10. c