

Carcinogénesis química ocupacional de la vejiga

1. RIESGO DE MUERTE POR NEOPLASIA VESICAL EN MEXICO:
 - a. 0.001 a 0.007 × 100 mil habitantes.
 - b. 0.056 a 0.092 × 100 mil habitantes.
 - c. 0.33 a 0.39 × 100 mil habitantes.
 - d. 1.12 a 2.21 × 100 mil habitantes.
 - e. 3.42 a 4 × 100 mil habitantes.

2. EL CANCER DE VEJIGA ES MAS FRECUENTE EN:
 - a. Habitantes de las urbes.
 - b. Habitantes del campo.
 - c. Habitantes de la montaña.
 - d. Habitantes del desierto.
 - e. Marinos.

3. LA INCIDENCIA DEL CANCER DE VEJIGA ES MAS ALTA EN:
 - a. Países subdesarrollados.
 - b. Países industrializados.
 - c. Países cafetaleros.
 - d. Países alpinos.
 - e. Países pesqueros.

4. INCREMENTO ANUAL MUNDIAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS:
 - a. 800
 - b. 12,000
 - c. 29,000
 - d. 51,000
 - e. 77,000

5. DE LAS MUERTES OCURRIDAS POR CANCER, ESTE ERA DE ORIGEN OCUPACIONAL EN EL:
 - a. 0.5% de los casos.
 - b. 2% de los casos.
 - c. 6% de los casos.
 - d. 10% de los casos.
 - e. 20% de los casos.

RESPUESTAS

1. c
2. a
3. b
4. e
5. d