

1. COMPARADO CON EL RESTO DE LA POBLACION, LOS FUMADORES DE FUERTES CANTIDADES DE TABACO TIENEN UN RIESGO MAYOR DE DESARROLLAR CANCER EN LA VEJIGA, DE ALREDEDOR DE:
  - a. 2 veces.
  - b. 4.3 veces.
  - c. 6 veces.
  - d. 8.21 veces.
  - e. 10.3 veces.
2. UNA DE LAS SUSTANCIAS SIGUIENTES PROVOCA TUMORES VESICALES EN CASI EL 100% DE QUIENES LA MANEJAN EN SU FORMA DESTILADA:
  - a. Bencidina.
  - b. 4-amino bifenil.
  - c. 2-naftilamina.
  - d. 6-mercaptapurina.
  - e. 5-fluoruracilo.
3. FACTOR DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO Y ACUMULACION DE LOS METABOLITOS QUE PROMUEVEN E INICIAN LA NEOPLASIA VESICAL:
  - a. Oxidoreducción del fierro.
  - b. Hidroxilación de las aminas aromáticas.
  - c. Acetilación del amonio.
  - d. Saturación de hidrocarburos.
  - e. Alcalinización del azufre.
4. EL CANCER DE LA VEJIGA ES MAS FRECUENTE EN EL HOMBRE QUE EN LA MUJER EN UNA PROPORCION DE:
  - a. 1:1
  - b. 2:1
  - c. 2.5:1
  - d. 3:1
  - e. 3.8:1
5. LUGAR DONDE ES MAYOR LA INCIDENCIA DEL CANCER VESICAL:
  - a. Egipto.
  - b. Rusia.
  - c. Estados Unidos.
  - d. Argentina.
  - e. Australia.

## Carcinogénesis química ocupacional de la vejiga

### RESPUESTAS

5.  
a  
4.  
d  
3.  
b  
2.  
c  
1.  
e