

**Fauna de Heteroptera de la "Mata do Córrego do Paraíso",  
Viçosa, Minas Gerais, Brasil. II. Patrones temporales.  
Distribución anual y estacionalidad**

ALEXANDRE SILVA DE PAULA<sup>1</sup>  
PAULO SÉRGIO FIUZA FERREIRA<sup>1</sup>

**Resumen.** El presente estudio es una contribución al conocimiento sobre los Heteroptera muestreados con trampas de luz en la "Mata do Córrego do Paraíso", Viçosa, Minas Gerais, Brasil, con la finalidad de establecer patrones temporales relacionados con la distribución anual y estacionalidad (periodos de lluvia y sequía) de las especies. Se observó la fluctuación del número de individuos y especies a lo largo del periodo de muestreo. El mayor número de individuos y especies se presentó durante las estaciones de lluvia y el número menor, durante las de sequía. Las variaciones en la precipitación y evaporación actuaron como estímulos temporales en la frecuencia de especies e individuos de Heteroptera.

**Palabras clave:** Hemiptera, Heteroptera, ecología, bosque atlántico, análisis faunístico.

**Abstract.** Studies on Heteroptera diversity collected by black light trapping were conducted in a tropical forest at Viçosa, State of Minas Gerais, Brazil. This work is concerned with the distribution and seasonal activities of species in the rain and dry seasons. The largest number of individuals and species were observed in the rain season. The precipitation and evaporation were the most important abiotic factors acting on activities of Heteroptera. The fluctuation of individuals and species during the time of the experiments are also considered.

**Key words:** Hemiptera, Heteroptera, ecology, Atlantic forest, faunistic analysis.

<sup>1</sup> Departamento de Biología Animal, Universidade Federal de Viçosa, 36571-000, Viçosa, Minas Gerais, Brasil

### **Introducción**

La diversidad de adaptaciones inter e intraespecíficas relacionadas con los eventos temporales son de extrema importancia en la distribución geográfica y estacional de los insectos (Wolda 1978; Tauber & Tauber 1981). Procurando alcanzar una sincronización frente a los eventos temporales, los insectos desarrollaron la habilidad de anticiparse a los cambios estacionales y efectuar alteraciones fisiológicas y de comportamiento para sobrevivir en condiciones desfavorables. Esta sincronización generalmente ocurre durante un estadio determinado del ciclo de vida de los insectos como una respuesta a los estímulos ambientales que anteceden a las condiciones desfavorables (Tauber & Tauber 1981).

La información básica sobre la historia de vida de los insectos en los trópicos es escasa, son pocos los estudios sobre la variabilidad temporal de las poblaciones de insectos (Wolda 1986); aproximadamente 60% de estos estudios publicados se realizaron en América tropical, específicamente en Panamá, Costa Rica y Brasil; sólo 22% en África y 17% en Asia (Wolda 1988). En Brasil destacan los trabajos pioneros de Davis (1945) y Dobzhansky & Pavan (1950).

Dentro de los estudios que incluyen fenómenos estacionales relacionados con los Heteroptera en regiones tropicales sobresalen los de Derr (1980, 1981), Tanaka & Wolda (1987, 1988) y Wolda & Tanaka (1987) y en regiones templadas, los de Southwood (1960) y Heiss *et al.* (1991).

El objetivo de este estudio fue el esclarecer patrones temporales relacionados con la distribución anual y la estacionalidad de los Heteroptera muestreados con trampa de luz en la "Mata do Córrego do Paraíso", Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

### **Área de estudio**

"Mata do Córrego do Paraíso", es una área de reserva natural de la Universidad Federal de Viçosa (UFV - Centro de Estudios de Selvas Naturales 20° 45' S: 45° 52' O), con una altitud media de 650 metros. Abarca, aproximadamente, 194 ha. de bosques secundarios en el municipio de Viçosa, MG. La reserva está regada por el río Turvo, afluente del Piranga y presenta una geología esencialmente gnésica, del Precámbrico inferior (4700 MA).

Según la clasificación de Köppen, el clima de la región está caracterizado como templado lluvioso (mesotérmico), también llamado subtropical de altitud - Cwb (Antunes 1986).

### **Material y método**

Los análisis de patrones temporales relacionados con la heteropterofauna muestreada en la "Mata do Córrego do Paraíso", comprendieron estudios de la distribución anual

y de estacionalidad (periodos de lluvia y sequía) de las especies. Como estaciones de sequía se definieron los períodos en que la evaporación excedió a la precipitación, y estaciones de lluvia en los que la precipitación excedió a la evaporación. Esos períodos fueron de octubre de 1981 a marzo de 1982 (estación de lluvia 1), abril a noviembre de 1982 (estación de sequía 1), diciembre de 1982 a mayo de 1983 (estación de lluvia 2), junio a agosto de 1983 (estación de sequía 2), noviembre de 1986 a abril de 1987 (estación de lluvia 3), mayo a agosto de 1987 (estación de sequía 3), septiembre de 1987 a febrero de 1988 (estación de lluvia 4) y septiembre de 1992 a enero de 1993 (estación de lluvia 5).

Las evaluaciones estadísticas efectuadas con DataDesk 5.0 para Macintosh comprendieron análisis de varianza, correlación de Spearman y análisis de agrupamiento para evidenciar los patrones temporales de la distribución anual y la estacionalidad para la heteropterofauna muestreada en la localidad referida. Como complemento, el número de especies y de individuos fueron agrupados por familia para evaluar las variaciones temporales relativas a esta categoría taxonómica.

### Resultados y discusión

La figura 1 muestra la distribución de los Heteroptera en la "Mata do Córrego do Paraíso" y el patrón de distribución anual para el taxón. El mayor número de individuos y de especies ocurrió en diciembre y en junio el menor. Los resultados de Southwood (1960) para la Estación Experimental de Rothamsted (Inglaterra) muestran que el mayor número de individuos se colectó entre junio y septiembre (verano), siendo la familia Miridae la más abundante. Las familias Lygaeidae, Berytidae y Piesmidae se colectaron en mayor número durante la primavera (marzo/junio). En la "Mata do Córrego do Paraíso", el periodo con mayor abundancia de individuos fue de septiembre a diciembre, la primavera en el hemisferio sur. Esta estación coincide con la de mayor actividad de los Pentatomomorpha muestreados por Southwood (1960).

La figura 2 presenta la fluctuación de individuos y especies de Heteroptera a lo largo del periodo de muestreo. El mayor número de especies tuvo lugar durante las estaciones de lluvia y abarcó muchas veces los períodos de transición entre una y otra estación. Se observaron variaciones en el número de individuos en las épocas de transición estacional de lluvia y de sequía. Los resultados sugieren que los factores abióticos, de precipitación y evaporación, fueron los estímulos temporales responsables de la frecuencia de especies e individuos del taxón en la "Mata do Córrego do Paraíso".

Los valores de evaporación mostraron pequeñas variaciones a lo largo del periodo de estudio y la precipitación mostró una gran irregularidad, observándose períodos de sequía de ocho a tres meses (Fig. 3). Posiblemente las variaciones en la composición y abundancia de la heteropterofauna estén asociadas con estas fluctuaciones en la distribución de las precipitaciones.

Se obtuvieron diferencias significativas en la abundancia de las especies entre las estaciones de sequía y de lluvia por medio del análisis de varianza ( $F = 26.8$ ,  $p \leq 0.001$ ). Durante las estaciones de lluvia se encontró 84.5% de las especies y 72% del




Fig. 1. Patrón de estacionalidad anual para los Heteroptera muestreados con trampa luminosa en la “Mata do Córrego do Paraíso”, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.




Fig. 2. Fluctuación del número de individuos y especies de Heteroptera en las estaciones de lluvia (LL) y sequía (S) en la “Mata do Córrego do Paraíso”, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.




Fig. 3. Estaciones de lluvia y de sequía definidas según valores de precipitación y evaporación - lluvia 1 (1), sequía 1(2), lluvia 2 (3), sequía 2 (4), lluvia 3 (5), sequía 3 (6), lluvia 4 (7) y lluvia 5 (8).

número de individuos. A su vez, las estaciones de sequía comprendieron 62.2% de las especies y 28% del número de individuos.

El análisis de varianza realizado para comparar los cinco períodos de lluvia y tres de sequía demostró la existencia de diferencias significativas entre las medias poblacionales de las especies de Heteroptera ( $F = 61.81, p \leq 0.001$ ), como sigue:  $1.20 \pm 4.67$  (lluvia 1),  $1.38 \pm 6.40$  (sequía 1),  $1.02 \pm 3.77$  (lluvia 2),  $0.09 \pm 0.53$  (sequía 2),  $2.47 \pm 8.07$  (lluvia 3),  $0.23 \pm 0.79$  (sequía 3),  $1.51 \pm 7.94$  (lluvia 4) y  $0.28 \pm 1.55$  (lluvia 5).

De la correlación de Spearman efectuada para comparar la frecuencia de especies entre los períodos estacionales, 64% resultó no significativa (Cuadro 1), demostrando que la composición de especies no presenta relaciones de causa/efecto entre los períodos estacionales.

En el Cuadro 2 se marcan con asteriscos las especies características de los períodos de lluvia (\*) y de sequía (\*\*).

La figura 4 presenta el agrupamiento (enlace completo y distancia euclídea) para la frecuencia de especies entre las estaciones de lluvia y de sequía. Las estaciones de lluvia tendieron a un agrupamiento diferente al de las estaciones de sequía presentando una mayor semejanza en la composición de especies en los períodos de lluvia.

La figura 5 presenta los valores relativos al número de individuos por familia en las estaciones muestreadas. En las estaciones de lluvia se presentaron las familias Cydnidae, Lygaeidae, Miridae y Pentatomidae, alternándose en relación al número de individuos. En las estaciones de sequía, esta alternancia se observó entre las familias Pentatomidae



**Cuadro 2,** continúa

Especies	FR LL	FR S	AB LL	AB S
<i>C. riocensis</i> Carvalho & Fontes 1983	16	3	2.92	0.33
<i>C. viossensis</i> Carvalho & Ferreira 1986	34	41	6.00	6.32
<i>Collaria scenica</i> (Stål 1859) **	0	3	0.00	0.33
<i>C. oleosa</i> (Distant 1883)	19	9	13.50	1.25
<i>Collaria</i> sp.	19	3	6.33	0.25
<i>Crassicornus pulchrus</i> Carvalho 1945	3	3	0.25	0.33
<i>Cylapocoris sulinus</i> Carvalho & Fontes 1969	0	6	0.00	0.58
<i>Dagbertus carmelitanus</i> Carvalho & Fontes 1969	13	6	2.85	1.20
<i>D. diamantinus</i> Carvalho 1984 *	13	0	10.60	0.00
<i>D. insignis</i> Carvalho 1977 *	13	0	2.20	0.00
<i>D. obscurus</i> Carvalho & Fontes 1983 *	9	0	1.42	0.00
<i>D. phaleratus</i> (Berg 1892)	3	3	0.20	0.25
<i>Deropthalma minuscula</i> Carvalho 1944 *	3	0	0.33	0.00
<i>Diplózona brasiliiana</i> Carvalho & Costa 1990	9	3	4.00	0.50
<i>Dolichomiris linearis</i> Reuter 1882 *	3	0	0.50	0.00
<i>Eccritotarsus corcovadensis</i> Carvalho & Schaffner 1986	3	3	0.25	0.25
<i>E. hyalinus</i> Stål 1860	19	9	2.62	1.33
<i>Eccritotarsus</i> sp. **	0	3	0.00	0.33
<i>Esavia viosensis</i> Carvalho & Ferreira 1986 *	3	0	0.25	0.00
<i>Eucerella robusta</i> (Carvalho & Ferreira 1986) *	3	0	0.20	0.00
<i>Falconisca viosensis</i> Carvalho & Ferreira 1986	3	3	0.25	0.20
<i>Fulvius quadrastillatus</i> (Stål 1860)	38	19	32.47	3.30
<i>Fulvius</i> sp.	44	3	9.60	0.40
<i>Fulvius</i> sp. 01	28	13	9.08	1.67
<i>F. sp. 02</i> *	6	0	1.67	0.00
<i>F. sp. 03</i>	38	28	20.40	9.58
<i>F. sp. 04</i>	25	19	6.70	2.58
<i>F. sp. 05</i>	22	3	5.42	0.33
<i>Horciasinus signorti</i> (Stål 1859) *	3	0	0.50	0.00
<i>H. wallengreni</i> (Stål 1860) **	0	9	0.00	1.17
<i>Hyaliodocoris clarus</i> (Stål 1860)	13	19	1.58	4.33
<i>H. insignis</i> (Stål 1860) *	0	3	0.00	0.25
<i>Hyalochloria itatiaiensis</i> Carvalho 1886 *	6	0	1.25	0.00
<i>Hyalochloria</i> sp. *	16	0	3.67	0.00
<i>Hyalopsallus diaphanus</i> (Reuter 1907) *	3	0	0.20	0.00
<i>Linharesmiris</i> sp. *	6	0	0.75	0.00
<i>Macrolophus basicornis</i> (Stål 1860) *	3	0	0.25	0.00
<i>M. cuiabanus</i> Carvalho 1945 *	9	0	1.75	0.00
<i>Macrolophus</i> sp. *	3	0	0.50	0.00
<i>Neostenotus fucipennis</i> (Reuter 1909)	25	25	8.70	7.35
<i>N. nigroviridis</i> Carvalho & Ferreira 1986 *	16	0	1.62	0.00
<i>Neostenotus</i> sp. **	0	6	0.00	0.45
<i>Nigromiris pallidipes</i> Carvalho & Schaffner 1973	6	3	0.45	0.50
<i>Orthotylus angeloi</i> Carvalho 1986	13	3	7.15	0.25







Cuadro 2, continúa

Especies	FR LL	F R S	AB LL	AB S
<i>Loxa picticornis</i> Horvath 1925 *	9	0	1.58	0.00
<i>L. virescens</i> Amyot & Serville 1843 *	19	0	2.42	0.00
<i>L. viridis</i> (Palisot de Beauvois 1805)	25	13	3.67	1.33
<i>Mayrinia curvidens</i> (Mayr 1864)	44	25	9.23	4.90
<i>M. variegata</i> (Distant 1880)	22	19	4.87	2.30
<i>Mormidea</i> sp. **	0	3	0.00	0.25
<i>Phoeacia</i> sp.	9	16	5.80	8.17
<i>Serdia concolor</i> Ruckes 1958	38	22	16.00	8.33
<i>Stictochilus tripunctatus</i> Bergroth 1918 *	3	0	0.20	0.00
<i>Taurocerus</i> sp.	3	3	0.25	0.25
<i>Thyanta</i> sp. 01 **	0	3	0.00	0.33
<i>T.</i> sp. 02	6	3	2.00	0.33
<i>Tynacantha marginata</i> Dallas 1851 **	0	3	0.00	0.20




Fig. 4. Agrupamiento de la composición estacional de especies de Heteroptera muestreados en la “Mata do Córrego do Paraíso”, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Enlace completo y distancia euclíadiana.

y Miridae. Los resultados mostraron que no predomina una determinada familia en las estaciones estudiadas. La alternancia de familias parece ser la regla para las variaciones estacionales en el número de individuos de la heteropterofauna en la “Mata do Córrego do Paraíso”. En cuanto al número de especies, predominó Miridae, excepto en la estación de lluvia 5, en la que predominó Pentatomidae (Fig. 6).



### Literatura citada

- ANTUNES, F.Z. 1986. Caracterização climática do estado de Minas Gerais. *Informe Agropecuario* 12: 9-13.
- DAVIS, D.E. 1945. The annual cycles of plants, mosquitoes, birds and mammals in two Brazilian forests. *Ecological Monographs* 15: 243-295.
- DERR, J.A. 1980. The nature of variation in life history characteristics of *Dysdercus bimaculatus* Stål (Heteroptera, Pyrrhocoridae), a colonizing species. *Evolution* 34: 548-557.
- DERR, J.A. 1981. Light-trap catches of *Dysdercus bimaculatus* Stål (Heteroptera, Pyrrhocoridae), in relation to weather and the fruiting cycle of its host-plants. *Bulletin of Entomological Research* 71: 47-56.
- DOBZHANSKY, T. & C. PAVAN. 1950. Local and seasonal variations in relative frequencies of species of *Drosophila* in Brazil. *Journal of Animal Ecology* 19: 1-14.
- HEISS, E., H. GÜNTHER, C. RIEGER & H. MALICKY. 1991. Artenspektrum und phänologie von Heteroptera aus lichtfallenabschlägen von Kreta. *Berichte Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck* 78: 119-143.
- SOUTHWOOD, T.R.E. 1960. The flight activity of Heteroptera. *Transactions of the Royal Entomological Society of London* 112 (8): 173-220.
- TANAKA, S. & H. WOLDA. 1987. Seasonal wing length dimorphism in a tropical seed bug, ecological significance of the short-winged form. *Oecologia* 73: 559-565.
- TANAKA, S. & H. WOLDA. 1988. Oviposition behavior and diel rhythms of flight and reproduction in two species of tropical seed bugs. *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Series C*. 91: 165-174.
- TAUBER, C. & M. TAUBER. 1981. Insect seasonal cycles: genetic and evolution. *Annual Review of Ecology and Systematics* 12: 281-308.
- WOLDA, H. 1978. Fluctuations in abundance of tropical insects. *American Naturalist* 112: 1017-1045.
- WOLDA, H. 1986. Seasonality and the community. In: Gee, J.H.R. & P.S. Giller (eds.) *Organization of communities past and present*. Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 69-95.
- WOLDA, H. 1988. Seasonality of tropical insects. I. Leafhoppers (Homoptera) in Las Cumbres, Panama. *Journal of Animal Ecology* 49: 277-290.
- WOLDA, H. & S. TANAKA. 1987. Dormancy and aggregation in a tropical insect *Jadera obscura* (Hemiptera, Rhopalidae). *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Series C*. 90: 351-366.

Recibido: 6.III.1997

Aceptado: 27.XI.1997.